

TEBUZOLE 250 EC

تیبوزول ۲۵۰ إي سي

Active ingredient:

Tebuconazole 25 % (w/v)

المادة الضعالة :

تیبوکونازول ۲۵ ٪ (و/ح.)

Properties:

Systemic fungicide in form of emulsifiable concentrate

الخصائص :

مبيد فطري جهازي على هيئة سائل مركز قابل للاستحلاب

Features:

with protective ,curative and eradicant action ,
Rapidly absorbed into the vegetative parts of
the plants with translocation principally
acropetally

مميزات :

يتميز بقدراته على استئصال الامراض الفطرية
بالإضافة الى قدراته العلاجية والوقائية .
يمتص بسرعة من المجموع الخضري وينتقل داخل
النبات من الاوراق الى الجذور مما يعطي مقاومة عالية
للأمراض حتى في المناطق التي لم ترش مباشرة بالمبيد.

Rates of use:

معدلات الاستخدام :

| فترة الأمان PHI | نسبة الاستعمال Rate of use | الامراض المكافحة controlled diseases | المحصول Crops |
|--------------------|--|---|---|
| ۲۱ يوم 21 days | ۷۰ - ۵۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء 50 - 70 ml / 100 L water | التبقع، البياض الدقيقي، الجرب والعفن الابيض Spots, Powdery mildew, scab, White Rot | اللوزيات والتفاحيات Pome Fruit & Stone fruit |
| ۲۱ يوم 21 days | ۷۰۰ - ۵۰۰ مل / هكتار 500 - 700 ml / ha | البياض الدقيقي ، العفن البني Powdery mildew , botrytis | العنب grapes |
| ۲۸ يوم 28 days | ۰,۵ - ۱ لتر / هكتار 0,5 - 1 L / ha | البياض الدقيقي، الصدأ، التبقع، تعفن الجذور Powdery mildew, Rusts, Spots, Root rot | الحاصلات الحقلية : القمح والشعير Cereals : wheat, barley |
| ۲۱ يوم 21 days | ۷۰۰ - ۵۰۰ مل / هكتار 500 - 700 ml / ha | التبقع البنفسجي والعفن الابيض Anthracnose, White rot | البصل والثوم Onion & Garlic |
| ۲۱ يوم 21 days | ۷۰۰ - ۵۰۰ مل / هكتار 500 - 700 ml / ha | التبقع Spots | الفاصولياء، البازيلاء، الفاصولياء Peas & Beans |
| ۲۱ يوم 21 days | ۷۰۰ - ۵۰۰ مل / هكتار 500 - 700 ml / ha | اللفحة المبكرة والمتأخرة ، العفن البني late Early Blight , botrytis | الطماطم والبطاطس Tomato & Potato |

