

INDOCARB 150 SC

اندوكارب ١٥٠ اس سي

Active ingredient:
Indoxacarb 15 % (w/v)

المادة الفعالة :
إندوكسكارب ١٥ % (و.ح.)

Properties:
Non systemic Insecticide acting by contact and ingestion in form of Suspension concentrate

الخصائص :
مبيد حشري غير جهازى يعمل عن طريق الملامسة والمعدة على هيئة سائل مركز معلق

Features:
High-efficacy at low usage rates and control a wide range of insects specially Lepidoptera suites on different crops effective on all larval stages in addition to its effectiveness on eggs

مميزات :
ذو فعالية عالية وبجرعات منخفضة لمكافحة مجموعة واسعة من الحشرات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة Lepidoptera على المحاصيل الزراعية المختلفة كما انه ذو فعالية على جميع الأطوار اليرقية إضافة الي فعاليته على البيوض

Rates of use:

معدلات الاستخدام :

نسبة الاستعمال Rate of use	الحشرات المكافحة controlled Pest	المحصول Crops
٢٥٠ - ٣٠٠ سم ^٣ / ١٠٠٠ لتر ماء 250-300 cm ³ / 1000 liter of water 25-30 cm ³ / 100 liter of water	أبو دقيق (المفلوف) ، دودة اللوز الأمريكية ، دودة لوز القطن ، ديدان أوراق المفلوف Almonds worm, Cotton Bollworm Cabbage worms	الخضروات : الطماطم المفلوف - الخيار الفلفل - الخس Vegetables: tomatoes, peppers, cucumber ,cabbage, lettuce
٢٥٠ - ٣٠٠ سم ^٣ / ١٠٠٠ لتر ماء 250-300 cm ³ / 1000 liter of water	دودة ثمار العنب ، جاسيد العنب ، ديدان أوراق العنب Grape worm , Grape leaf worm	العنب Grape
٢٥٠ - ٣٠٠ سم ^٣ / هكتار بالمرشات الأرضية بعد ٧ - ١٠ أيام من الحش وفي المراحل المبكرة لبدء الإصابة بحفارات ساق الذرة 250 - 300 cm ³ / ha After 7-10 days from mowers and in early stage of corn stem borer by boom sprayer	ديدان الأوراق ، الدودة الخضراء ، حفار ساق الذرة Leaf worms , green worms , corn stem borer	محاصيل الأعلاف : برسيم - رودس - ذرة علفية Forage crops : Clover , Sorghum alfalfa
٢٥٠ - ٣٠٠ سم ^٣ / هكتار بالمرشات الأرضية عند بداية ظهور أعراض الإصابة على المجموع الخضري قبل الانتقال للدرنات 250 - 300 cm ³ / ha win symptoms appear on the foliage part of the plant before reach to the tubers by boom sprayer	فراشة درنات البطاطس potato tubers moth	البطاطس Potatoes
٢٠٠ - ٣٥٠ سم ^٣ / ١٠٠٠ لتر ماء يتم الرش بعد بداية ظهور الفراشات يفضل متابعة حركة الحشرة باستخدام مصائد 300 - 350 cm ³ / 1000 liter of water After Appearance of butterfly its better to use a Traps to follow up insects movement	ديدان التفاح و الفاكهة بجميع أنواعها fruits & Apples worm	الأشجار المثمرة ، التفاح ، الأجاج ، الرمان ، الدراق ، المشمش ، التخييل Fruit trees , citrus apples, pears pomegranates peaches apricots , palm trees

PHI : 3 Days

فترة الامان : ٣ أيام

