

# مبيدات فطرية PESTICIDE FUNGICIDES

ستروبيزول ٣٢٥ اس سي

المادة الفعالة : ازوكسي ستروبين ٢٠٪ ( و/ح ) / دايفينوكونازول ١٢,٥٪ ( و/ح ) / مواد مضافة ٦٧,٥٪ ( و/ح )

الخصائص: مبيد فطري جهازى ذو تأثير علاجي ووقائي للعديد من الأمراض الفطرية . له سمية منخفضة وليس له تأثير على الثدييات وامن على البيئة والأعداء الحيوية ، يستخدم في برامج مكافحة متكاملة . ليس له متبقيات تراكمية في المحاصيل الغذائية .

## STROPIZOLE 325 SC

**Active Ingredients:** Azoxystrobin 20% (w/v) / Difenconazole 12.5% (w/v) / Additives 67.5% (w/v)

**Properties:** A systemic fungicide with both curative and preventive action against a wide range of fungal diseases. It has low toxicity, no harmful effects on mammals, and is environmentally friendly. It is safe for beneficial organisms and can be used in Integrated Pest Management (IPM) programs. It does not leave cumulative residues in food crops.

| المحصول<br>Crop                                                                      | الأمراض الفطرية<br>Fungal Diseases                                                                                                                             | نسبة الاستعمال<br>Application Rate                   | فترة التحريم<br>PHI |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| الملفوف ، الزهرة<br>Cabbage,<br>Cauliflower                                          | الأنثراكنوز ، تبقع الاوراق ،<br>البياض الدقيقي<br>Anthracnose, Leaf spot,<br>Powdery mildew                                                                    | ٥٠٠ – ٧٥٠ مل / هكتار<br>500 – 750 mL/ha              | ٢١ يوم<br>21 days   |
| الثوم ، البصل<br>Garlic, Onion                                                       | اللطعة الأرجوانية ، البياض<br>الزغبي ، لفحة الألترناريا<br>Purple blotch, Downy<br>mildew, Alternaria blight                                                   | ٥٠٠ – ٧٥٠ مل / هكتار<br>500 – 750 mL/ha              | ٢١ يوم<br>21 days   |
| الجزر<br>Carrot                                                                      | لفحة الأوراق ، البياض الدقيقي<br>Leaf blight, Powdery<br>mildew                                                                                                | ٥٠٠ – ٧٥٠ مل / هكتار<br>500 – 750 mL/ha              | ١٤ يوم              |
| الخيار ، الكوسا ، الحبوب<br>الشمام<br>Cucumber,<br>Zucchini,<br>Watermelon,<br>Melon | لفحة الأوراق ، الأنثراكنوز ،<br>البياض الازغبي ، البياض الدقيقي<br>Leaf blight, Anthracnose,<br>Downy mildew, Powdery<br>mildew                                | ٥٠ – ٧٠ مل / ١٠٠ لتر ماء<br>50 – 70 mL / 100 L water | ٢١ يوم<br>21 days   |
| العنب<br>Grape                                                                       | اللفحة المبكرة ، البياض الدقيقي ،<br>العفن الأسود ، البياض الزغبي ،<br>اعفان الثمار<br>Early blight, Powdery<br>mildew, Black rot, Downy<br>mildew, Fruit rots | ٥٠ – ٧٠ مل / ١٠٠ لتر ماء<br>50 – 70 mL / 100 L water | ١٤ يوم<br>14 days   |
| القمح                                                                                | البياض الدقيقي ، الأصداء                                                                                                                                       | ٥٠٠ – ٧٥٠ مل / هكتار                                 | ٣٠ يوم<br>30 days   |

## مبيدات فطرية PESTICIDE FUNGICIDES

|                   |                                                      |                                                                 |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | 500 – 750 mL/ha                                      | Powdery mildew, Rusts                                           | Wheat             |
| ٣ ايام<br>3 days  | ٥٠ – ٧٠ مل / ١٠٠ لتر ماء<br>50 – 70 mL / 100 L water | البياض الدقيقي ، تبقع الأوراق<br>Powdery mildew, Leaf spot      | الفلفل<br>Pepper  |
| ١٤ يوم<br>14 days | ٥٠٠ – ٧٥٠ مل / هكتار<br>500 – 750 mL/ha              | اللفحة المبكرة<br>Early blight                                  | البطاطس<br>Potato |
| ٧ ايام<br>7 days  | ٥٠ – ٧٠ مل / ١٠٠ لتر ماء<br>50 – 70 mL / 100 L water | اللفحة المبكرة ، البياض الدقيقي<br>Early blight, Powdery mildew | الطماطم<br>Tomato |