

# PESTICIDE FUNGICIDES مبيدات فطرية

هايجرين ٣٠٠ اس ال

-المادة الفعالة: هيمكسازول ٣٠% (و/ح)

المجموعة الكيميائية : OXAZOLES

الخصائص : مبيد فطري جهازى يُستخدم لمكافحة الفطريات الموجودة في التربة والتي تسبب أمراض تعفن الجذور والذبول، بما في ذلك أنواع **Corticium**، و**Fusarium**، و**Pythium**، و**Aphanomyces**، وبعض سلالات **Phlzoctonia** كما يساهم أيضًا في تعزيز نمو الجذور والنبات.

## HYGRIN 300 SL

**Active Ingredient:** Hymexazol 30% (w/v)

**Chemical Group:** OXAZOLES

**Properties:** A systemic fungicide used for controlling soilborne fungi that cause root rot and wilt diseases, including *Corticium* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Aphanomyces* spp., and some strains of *Phlzoctonia* spp. It also promotes root and plant growth.

| المحصول<br>Crop                                                                                                                                                   | الأمراض الفطرية<br>Fungal Diseases                                                                                                                                                        | نسبة الاستعمال<br>Application Rate                                                                                                                                                                                  | فترة التحريم<br>PHI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| الخضروات : القرعيات ،<br>الفلفل ، الطماطم ،<br>الباذنجان ، الباميا ،<br>الفاصوليا<br><b>Vegetables:</b><br>Cucurbits, Pepper,<br>Tomato, Eggplant,<br>Okra, Beans | امراض سقوط البادرات وامراض<br>الذبول التسببة عن الفطريات :<br>البيثيوم ، الفيوزاريوم<br>Seedling damping-off<br>and wilt diseases caused<br>by fungi: <i>Pythium</i> ,<br><i>Fusarium</i> | ١٠٠ - ١٥٠ مل / ١٠٠ لتر ماء .<br>تسقى البذور مباشرة بعد الزراعة<br>بمعدل ٣ لتر محلول / م <sup>2</sup><br>100 – 150 mL / 100 L<br>water<br>Apply directly after<br>sowing at a rate of 3 L<br>solution/m <sup>2</sup> | ٣٠ يوم<br>30 days   |
| مشاتل اشجار الفاكهة<br>والغابات<br>Fruit tree and forest<br>nurseries                                                                                             | امراض الذبول التسببة عن<br>الفطريات : البيثيوم ، الفيوزاريوم<br>Wilt diseases caused by<br>fungi: <i>Pythium</i> , <i>Fusarium</i>                                                        | ١٠٠ - ٢٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء .<br>تسقى البذور مباشرة بعد الزراعة<br>بمعدل ٣ لتر محلول / م <sup>2</sup><br>100 – 200 mL / 100 L<br>water<br>Apply directly after<br>sowing at a rate of 3 L<br>solution/m <sup>2</sup> | ٣٠ يوم<br>30 days   |
| نباتات الزينة<br>Ornamental plants                                                                                                                                | امراض الذبول التسببة عن<br>الفطريات : البيثيوم ، الفيوزاريوم<br>Wilt diseases caused by<br>fungi: <i>Pythium</i> , <i>Fusarium</i>                                                        | ١٠٠ - ١٥٠ مل / ١٠٠ لتر ماء .<br>تسقى البذور مباشرة بعد الزراعة<br>بمعدل ٣ لتر محلول / م <sup>2</sup><br>100 – 150 mL / 100 L<br>water<br>Apply directly after<br>sowing at a rate of 3 L<br>solution/m <sup>2</sup> | ٣٠ يوم<br>30 days   |