

# مبيدات فطرية FUNGICIDES PESTICIDE

ديكور ٢٥٠ اي سي

المادة الفعالة : ديفينوكونازول ٢٥% (و/ح)

-المجموعة الكيميائية : TRIAZOLE

- الخصائص: مبيد فطري جهازى من مجموعة تريازول الكيماوية له فعالية ضد مجموعة واسعة من الفطريات التي تصيب أوراق وسنابل محاصيل الحبوب وغيرها مثل الأصداء والبياض الدقيقي والسبتوريا وفيوزاريوم السنابل ورنكوسبوريوم وهلمنتوسبوريوم.

## DÉCOR 250 EC

**Active Ingredient:** Difenoconazole 25% (w/v)

**Chemical Group:** TRIAZOLE

**Properties:** A systemic fungicide from the triazole chemical group, effective against a wide range of fungi that affect the leaves and spikes of cereal crops and others, including rusts, powdery mildew, septoria, Fusarium head blight, Rhynchosporium, and Helminthosporium.

| فترة التحريم<br>PHI | نسبة الأستعمال<br>Application Rate   | الأمراض الفطرية<br>Fungal Diseases   | المحصول<br>Crop   |
|---------------------|--|--|---|
| ١٤ يوم<br>14 days   | ٠,٥ لتر / هكتار<br>يكرر الرش كل ١٤ يوم عند استخدام المعدل الاعلى.<br>مجموع عدد الرش في الموسم الواحد من ٤ - ٧ رشات<br>0.5 L/ha<br>Repeat every 14 days at the higher rate 4-7 applications per season. | اللفحة المبكرة<br>Early blight   | البطاطس<br>Potato   |
| ٧ ايام<br>7 days    |  | اللفحة المبكرة ، تبقع الأوراق ، السبتوري<br>Early blight, Leaf spot, Septoria        | الطماطم<br>Tomato   |
| ٣ ايام<br>3 days    | ٠,٥ لتر / هكتار<br>يبدأ الرش عند بداية ظهور المرض<br>0.5 L/ha<br>Start spraying at disease onset   | البياض الدقيقي ، الأنثراكنوز ، لفة الساق<br>Powdery mildew, Anthracnose, Stem blight | القرعيات : خيار ، بطيخ ، شمام ، كوسا<br>Cucurbits:<br>Cucumber, Watermelon, Melon, Zucchini |
| ٧ ايام<br>7 days    |  | اللفحة والأصداء ، اللطعة الأرجوانية ، الصدأ<br>Purple blotch, Blight, Rusts          | البصل ، الثوم<br>Onion, Garlic  |
| ٢١ يوم<br>21 days   |  | تبقع الأوراق الابيض والداكن<br>White and dark leaf spot                              | العائلة الصليبية : الزهرة ، الملفوف<br>Brassicac:<br>Cauliflower, Cabbage                   |

## مبيدات فطرية PESTICIDE FUNGICIDES

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| ١٤ يوم<br>14 days                     | ٠,٥ لتر / هكتار<br>يبدأ الرش عند بداية الأزهار وعند امتلاء القرون<br>0.5 L/ha<br>Start spraying at flowering and at pod filling   | التبقع الانثراكنوزي ، لفحة الأسكوكايتا ،<br>البياض الدقيقي<br>Anthracnose, Ascochyta blight, Powdery mildew               | الفاصوليا ، الفول ، البازيلاء<br>Beans, Broad beans, Peas |
| ١٤ يوم<br>٣ ايام<br>14 days<br>3 days | ٠,٥ لتر / هكتار<br>يبدأ الرش عند بداية ظهور المرض<br>0.5 L/ha<br>Start spraying at disease onset  | التبقع الالترناري ، تبقع الأوراق<br>السيركوسبوري ، الانثراكنوز<br>Alternaria leaf spot, Cercospora leaf spot, Anthracnose | الجزر ، الفلفل<br>Carrot, Pepper                          |
| ١٤ يوم<br>14 days                     | ٢٠ مل / ١٠٠ لتر ماء . وقائي كل ٧ - ١٠ ايام بداية من مرحلة القمة الخضراء للبرعم حتى وصول البرعم الى قطر ١٠ ملم علاجي لمرض الجرب: خلال ال ٩٦ ساعة الأولى من بداية موسم المرض حتى يصل البرعم الى قطر ٢٠ - ٣٠ ملم .<br>20 mL / 100 L water<br>Preventive every 7-10 days from green tip to 10 mm bud size. Curative for scab within 96 hours up to 20-30 mm bud | الجرب ، الأصداء ، البياض الدقيقي<br>Scab, Rusts, Powdery mildew   | التفاحيات<br>Pome fruits                                  |
| -                                     | الرشة الأولى في مرحلة البراعم ثم تكرر كل ٣٠ يوما ( ثلاث رشات )<br>First spray at bud stage, then every 30 days (total 3 sprays)   | الجرب<br>Scab   | الحمضيات<br>Citrus  |
| ١٤ يوم<br>14 days                     | ٠,٤ - ١ لتر / هكتار<br>الرشة الأولى عند الإزهار ( وقائي ) ثم يكرر الرش كل ٢٨ يوما<br>0.4 - 1 L/ha<br>The first spray should be applied at flowering (preventive), then repeated every 28 days   | البياض الدقيقي<br>Powdery midew   | المانجو<br>Mango  |
| -                                     | ٢٠ مل / ١٠٠ لتر ماء<br>بداية الرش مع بداية الموسم ويكرر كل ١٠ - ١٤ يوم ( ٦ - ٨ رشات خلال الموسم )<br>20 mL / 100 L water Start at season onset, repeat every 10-14 days (6-8 sprays/season)   | البياض الدقيقي ، العفن الأسود ،<br>الذراع الأسود<br>Powdery mildew, Black rot, Black arm                                  | العنب<br>Grape  |

## مبيدات فطرية PESTICIDE FUNGICIDES

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| <p>٢١ يوم<br/>21 days</p> | <p>٠,٥ لتر / هكتار<br/>يتم الرش بعد انبثاق السنابل حتى نهاية<br/>الإزهار ( الرش المبكر قد يسبب حساسية<br/>للقمح )<br/>0.5 L/ha<br/>Spray from spike emergence<br/>to end of flowering (early<br/>spray may cause sensitivity)</p> | <p>البياض الدقيقي ، الأصداء ، التبقع<br/>السبتوري ، التبقع الالترناري<br/>Powdery mildew, Rusts,<br/>Septoria, Alternaria leaf<br/>spot</p> | <p>القمح<br/>Wheat</p>   |
| <p>-</p>                  | <p>٠,٦ لتر / هكتار<br/>مع بداية تكوين الأزهار<br/>0.6 L/ha<br/>At flower formation stage</p>  | <p>البياض الدقيقي ، الأصداء ، التبقع<br/>الأسود<br/>Powdery mildew, Rusts,<br/>Black spot</p>   | <p>نباتات الزينة ( الورد ،<br/>القرنفل )<br/>Ornamental plants<br/>(Roses, Carnations)</p> |