

مبيدات فطرية FUNGICIDES PESTICIDE

ميتاجولد ٤٨٠ اي سي

-المادة الفعالة : ميتالاكسيل – م ٤٨% (و/ح)

المجموعة الكيميائية : PHENYLAMIDE

الخصائص : مبيد فطري جهازى يعمل بشكل وقائى وعلاجى لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية القاسطة في التربة المتسببة في الفطريات التابعة لرتبة الفطريات البيضية (Oomycete) في العديد من محاصيل الخضروات و الأشجار المثمرة كما يمكن خلطه مع مبيد وقائى للأمراض التي تصيب المجموع الخضري.

METAGOLD 480 EC

Active Ingredient: Metalaxyl-M 48% (w/v)

Chemical Group: PHENYLAMIDE

Properties: A systemic fungicide that works both preventively and curatively to control a variety of soilborne fungal diseases caused by oomycete fungi (Oomycetes), affecting many vegetable crops and fruit trees. It can also be mixed with a protective fungicide for diseases that affect the plant's foliage.

فترة التحرير PHI	نسبة الأستعمال Application Rate	الأمراض الفطرية Fungal Diseases	المحصول Crop
يستخدم عند الزراعة فقط Use at planting only	١ – ٢ لتر / هكتار او ٤,٥ – ٢,٥ مل / ١٠٠ متر من خطوط الزراعة بعد زراعة البذرة مباشرة او قبل نقل الشتلات الى الارض 1-2 L/ha 2.5-4.5 mL / 100 m planting row Apply directly after sowing seeds or before transplanting seedlings	موت البادرات Damping-off	القرعيات ، خيار ، كوسا ، بطيخ ، شمام Cucurbits: Cucumber, Zucchini, Watermelon, Melon
	١ – ٢ لتر هكتار قبل نقل الشتلات للزراعة 1-2 L/ha Apply before transplanting	عفن الجذور ، موت البادرات Root rot, Damping-off	طماطم ، فلفل ، باذنجان Tomato, Pepper, Eggplant
	٢ لتر / هكتار ، تعامل التقاوي بعد الزراعة مباشرة وقبل اغلاق الخطوط على ألا تقل كمية المحلول المستخدم عن ٣٠ لتر / هكتار 2 L/ha Apply directly after planting seed tubers and before covering rows Minimum 30 L solution/ha	عفن الدرنات ، العفن الزهري Tuber rot, Pink rot	البطاطس Potato

PESTICIDE FUNGICIDES مبيدات فطرية

	١,٢٥ لتر / هكتار وتضاف مع ماء الري عند الزراعة 1.25 L/ha Apply via irrigation water at planting	عفن الجذور Root rot	الجزر Carrot
	٠,٥ – ١ لتر / هكتار تضاف مع ماء الري باستخدام الرشاش 0.5–1 L/ha Apply with irrigation water using sprayer	موت البادرات Damping-off	البرسيم Alfalfa
-	١٥ – ٢٥ مل / ١٠٠ م² للنباتات الورقية مرة واحدة كل ثلاث اشهر . ٢٠ – ٤٠ مل / ١٠٠ م² للأزهار مرة واحدة كل ٦ اسابيع . ٤٠ – ٦٠ مل / ١٠٠ م² للنباتات الزينة والخشبية مرة واحدة كل ١٠ اسابيع . - 15–25 mL / 100 m² for leafy plants, once every 3 months - 20–40 mL / 100 m² for flowers, once every 6 weeks - 40–60 mL / 100 m² for ornamental/woody plants, once every 10 weeks	موت البادرات ، عفن الساق و الجذور Damping-off, Stem and root rot	نباتات الزينة Ornamental Plants