

مبيدات فطرية FUNGICIDES PESTICIDE

تبيوزول ٢٥٠ اي سي

-المادة الفعالة: تبيوكونازول ٢٥% (و/ح)

-المجموعة الكيميائية: TRIZOLE

الخصائص: مبيد فطري جهازى من مجموعة الترايازول ذو فعالية مزدوجة لمكافحة الأمراض الفطرية ووقاية المحاصيل منها مثل الفيوزاريوم والأصداء والسبتوريا والبياض الدقيقي والرنكوسبوريوم والهلثوسبوريوم وذلك على المحاصيل الحقلية والخضروات وأشجار الفاكهة، ويعتبر الأكثر فعالية مقارنة مع بقية المبيدات من نفس مجموعة الترايازول.

TEBUZOLE 250 EC

Active Ingredient: Tebuconazole 25% (w/v)

Chemical Group: TRIAZOLE

Properties: A systemic fungicide from the triazole group with dual action, effective in controlling and preventing fungal diseases on crops. It is effective against Fusarium, rusts, Septoria, powdery mildew, Rhynchosporium, and Helminthosporium on field crops, vegetables, and fruit trees. It is considered the most effective compared to other fungicides in the triazole group.

المحصول Crop	الأمراض الفطرية Fungal Diseases	نسبة الاستعمال Application Rate	فترة التحريم PHI
القمح Wheat	الأصداء ، البياض الدقيقي ، السبتوريا ، الفيوزاريوم ، هلمنثوسبوريم Rusts, Powdery mildew, Septoria, Fusarium, Helminthosporium	٠,٤ - ٠,٧ لتر / هكتار 0.4 – 0.7 L/ha	٣٥ يوم 35 days
الشعير Barley	البياض الدقيقي ، رانكوسبوريم ، هلمنثوسبوريم Powdery mildew, Ramularia, Helminthosporium		٣٥ يوم 35 days
العنب Grapes	العفن الرمادي ، البياض الدقيقي Grey mold, Powdery mildew		٣٠ يوم 30 days
الطماطم Tomato	اللفحة المبكرة ، البياض الدقيقي ، العفن الرمادي Early blight, Powdery mildew, Grey mold		٧ ايام 7 days
البطاطس Potato	اللفحة المبكرة Early blight		٣٠ يوم 30 days
البصل والثوم Onion & Garlic	التبقع الأرجواني ، الأصداء Purple blotch, Rusts		١٤ يوم 14 days
اشجار الفاكهة Fruit trees	العفن الرمادي ، البياض الدقيقي ، الفيوزاريوم Grey mold, Powdery mildew, Fusarium		١٤ يوم 14 days