

الاستروبيلزول ٣٢٥ س
النحاسية والديكوفول
يفضل خلط المبيد
المعرفة القابلية للخلط

ستروبيرول ٢٢٠ اس سي، يمكن خلط المبيد مع عدد من مبيدات الآفات الزراعية عدة التي تحتوي على المركبات الحاسوبية والنيكوتينول، كذلك يجب عدم خلط المبيد مع الأسمدة الوقائية التي تحتوي على نيونروجين، كما أنه لا يفضل خلط المبيد مع المركبات الزيتية لأنها تمنع الامتصاص من قبل النباتات، يفضل إجراء تجارب خلط مسفرة لمعرفة القابلية للخلط.

مكتبه

ستروبيرول ٣٢٠ اس سي: يحفظ المبيد في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان جيد التهوية بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن البذور والأعلاف.

فيلم السمية علي النحل ويجب عدم تلوث مص

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لامس العين أو الجلد ، سام للأسماك والأحياء المائية وكما إن المبيد خفيف السمية على النحل ويجب عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد.

ٲٲان ، دوار-

غثيان ، دوار.
لا توجد جرعة مضادة وتتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرة.

اتبع التعليما
بدقة.

- | | |
|--|--|
| <p>• عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.</p> <p>• تجنب غسل الملابس القطنية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.</p> <p>• لا تستخدم الألبسة القاترة ويتم التخلص منها ومن باقي المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمناسبة عليها.</p> <p>• تجنب مداعبة العينين.</p> | <p>• اتباع التعليمات المرفقة على بطاقة الاستخدام بدقة.</p> <p>• تجنب الملابس الموضوعة (مئزر ، حذاء ، قبعة ، قفازات وقائية).</p> <p>• تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.</p> <p>• تجنب استنشاق رذاذ المبيد.</p> <p>• تجنب ملاصقة المبيد للجلد والأنف والعين.</p> |
|--|--|

منع متعاً باتاً إعادة استخدام
بزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية

يُمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

ضمن الشركة
حمل الشركة

تتضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسئولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

DELTA
SULFUR COMPANY
www.sdelta.com.sa

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries

● المملكة العربية السعودية ●
● Kingdom of Saudi Arabia ●

● هاتف: +966 112 654 532 ● ● فاكس: +966 112 654 533 ●
● Tels: +966 112 654 533 ●

رقم التسجيل ● المملكة العربية السعودية ●
3683- 5191 - 346

تاريخ الانتهاء ● مطبوع على العمرة

Group

3

11

Fungicide



ستروبيزول

STROPIZOLE 325 SC



مبيد فطري علي صيغة سائل مركز معلق SC

صيغة المبيد

Composition	Ratio	النسبة	التركيب
Azoxystrobin	20% (W/V)	٥٢٠ و / ح	أزوكسي ستروبين
Difenoconazole	12.5% (W/V)	٥١٢٥ و / ح	دايفينوكونازول
Additive	67.5% (W/V)	٥٢٧٥ و / ح	مواد مضادة
Total	100% (W/V)	٥١٠٠ و / ح	المجموع

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

500 ml

٥٠٠ مل

عند الإبتلاع: يغسل فم المصطب
بمياه ويُنزَم مراجعهُ الطَّبِيب إذا

- [illegible]

استروبينزول
منخفضة وليست

استروبيول ٣٢٠ أس سي: مبيد فطري جهازى ذو تأثير علاجي وقائى للعديد من الأمراض الفطرية ، له سمية منخفضة وليس له تأثير على الثدييات وأمن على البيئة والأعداء الحيوية ، يستخدم في برامج مكافحة لمكافحة (IPM) ، ليس له متبقيات تراكمية في المحاصيل الغذائية.

الحاصلين ومعدلات الاستعمال			
المحصول	المرض	معدل الاستخدام	فترة التحريم
المفوف والزهرة	الأنثراكوز ، تبقع الأوراق ، البياض الدقيقي	٥٠٠ - ٧٥٠ مل / هكتار	٢١ يوم
الثوم والبصل	- الملطمة الأرجوانية - البياض الزغبي - لفحة الأنثراكيا	٥٠٠ - ٧٥٠ مل / هكتار	٢١ يوم
الجزر	لفحة الأوراق ، البياض الدقيقي	٥٠٠ - ٧٥٠ مل / هكتار	١٤ يوم
الخيار، الكوسا ، الريحيد، الشمام	لفحة الأوراق ، الأنثراكوز ، البياض الزغبي ، البياض الدقيقي	٥٠ - ١٠٠ مل / ١٠٠ م ² ماء	٢١ يوم
العنب	اللفحة المبكرة ، البياض الدقيقي ، الففن الأسود ، البياض الزغبي ، أفضان الثمار	٥٠ - ٧٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	١٤ يوم
القمح	البياض الدقيقي ، الأصداء	٥٠٠ - ٧٥٠ مل / هكتار	٢٠ يوم
الفاصل	البياض الدقيقي ، تبقع الأوراق	٥٠ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	٣ أيام
البطاطس	اللفحة المبكرة	٥٠٠ - ٧٥٠ مل / هكتار	١٤ يوم
الطماطم	اللفحة المبكرة ، البياض الدقيقي	٥٠ - ٧٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام

لا يستعمل المبيد
حساس لأزوكسيفيد

لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصق مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف إن بعض أنواع التفاح حساس لأزوكسيفين لذلك يجب الاحتياط أن لا يستعمل عند وجود خطر انحراف الرش على تفاح مجاور لأنه قد يسبب حريق

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة الم
يجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء
(3)

يتمتع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ، يجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قفازات ، أفتحه) قبل الدخول وملازمة الأجزاء المعاملة (التيات

الديكوهول ، كذلك ي

الستروبيزول ٢٢٥ س سي: يمكن خلط المبيد مع عدد من مبيدات الآفات الزراعية عدا التي تحتوي علي المركبات النحاسية الديكوفول، كذلك يجب عدم خلط المبيد مع الأسمدة الورقية التي تحتوي علي نيتروجين، كما أنه لا يفضل خلط المبيد



Caution **تحذير**

